

WJGOG 132 投与量設定フォローシート

症例登録番号【 132 - 】

前コース【第()コース】投与量 (該当 level に✓)

イリノテカン	<input type="checkbox"/> level +2	80 mg/m ²	エトポシド	<input type="checkbox"/> level 0	50 mg/body
	<input type="checkbox"/> level +1	70 mg/m ²		<input type="checkbox"/> level -1	25 mg/body
	<input type="checkbox"/> level 0	60 mg/m ²			
	<input type="checkbox"/> level -1	50 mg/m ²			
	<input type="checkbox"/> level -2	40 mg/m ²			

■ イリノテカン・経口エトポシドの減量規準

- 1) コース中、以下のいずれかの有害事象が確認された場合、下記規準に従って次コースより減量する。
コース内減量は行わない。
- 2) 2つ以上の項目に該当した場合も、それぞれの薬剤は1段階のみの減量とする。
- 3) イリノテカンがレベル-2への減量後に再び減量規準に該当した場合はプロトコル治療中止とする。
- 4) エトポシドがレベル-1への減量後に再び減量規準に該当した場合はプロトコル治療中止とする。
- 5) イリノテカンがレベル-2、かつ経口エトポシドがレベル-1になった場合はプロトコル治療中止とする。

減量 規準	発現した項目に✓	次コース イリノテカン	発現した項目に✓	次コース 経口エトポシド
血小板数 50,000/mm ³ 以下	<input type="checkbox"/>	1レベル下げる	—	変更なし
Grade3の発熱性好中球減少	<input type="checkbox"/>	1レベル下げる	—	変更なし
Grade3-4の好中球減少を伴う感染	<input type="checkbox"/>	1レベル下げる	—	変更なし
AST / ALT 200IU以上	<input type="checkbox"/>	1レベル下げる	—	変更なし
血清総ビリルビン 3.0以上	<input type="checkbox"/>	1レベル下げる	—	変更なし
クレアチニン 2.0 mg/dL以上	<input type="checkbox"/>	1レベル下げる	—	変更なし
Grade3以上の悪心、嘔吐、食欲不振	—	変更なし	<input type="checkbox"/>	25mg/bodyに減量

増量 規準	発現した項目に✓	次コース イリノテカン	発現した項目に✓	次コース 経口エトポシド
前コースにおいて血液毒性、非血液毒性がすべてGrade1以下	<input type="checkbox"/>	1レベル上げる	—	変更なし

次コース【第()コース】投与量 (該当 level に✓)

イリノテカン	<input type="checkbox"/> level +2	80 mg/m ²	エトポシド	<input type="checkbox"/> level 0	50 mg/body
	<input type="checkbox"/> level +1	70 mg/m ²		<input type="checkbox"/> level -1	25 mg/body
	<input type="checkbox"/> level 0	60 mg/m ²			
	<input type="checkbox"/> level -1	50 mg/m ²			
	<input type="checkbox"/> level -2	40 mg/m ²			
<input type="checkbox"/> 中止					